

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 13-8-79158931

N° 151 - 7 AOUT 1979

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE des STATIONS d'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDÈCHE, DROME, ISÈRE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ABONNEMENT ANNUEL: 60 F

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3 Répondeurs : (78) 60-17-74
Tél. (78) 62.20.30 (Postes 426 et 427) Ardèche-Drôme : (75) 43-34-36

C.C.P. LYON 9431-17
Régisseur Avances et Recettes D. D. A.
55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

ATTENTION ! Respecter strictement les délais de carence lors de l'utilisation des divers pesticides

VIGNE

MILDIOU - BOTRYTIS - Le traitement fongicide de fin de saison, effectué à l'aide d'un produit efficace contre ces deux maladies, permettra d'enrayer les quelques foyers existants.

OIDIUM - Maintenir la protection sur cépages sensibles.

TORDEUSES de la GRAPPE - La protection n'est plus nécessaire dans les régions 122-124-131-132-133-142-147 et 152. Elle devra être assurée jusqu'au 18 août dans les régions de précocité moyenne.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE et TORDEUSE ORIENTALE - Les différents vols se chevauchent d'une région à une autre comme à l'intérieur de chaque région, de sorte que la protection doit être maintenue partout. Toutefois, elle ne sera plus nécessaire sur noyer dès le durcissement de la coque.

MOUCHE des FRUITS - Les premiers insectes ont été détectés dans la banlieue lyonnaise. En zone péri-urbaine, où le risque est le plus important, on peut déterminer l'importance des populations à l'aide de pièges commercialisés à cet effet par certaines firmes et définir ainsi le degré de nécessité d'une intervention spécifique (Anthio, Baytex, Dicontal, Dipterex Perthane EC, Tugon, ou une des nombreuses spécialités à base de Diméthoate ou de Malathion).

PSYLLE du POIRIER - La surveillance des populations ne peut encore être relâchée.

ACARIENS sur POMMIERS :

ERIOPHYIDE (Aculus) - Des dégâts importants ont déjà été constatés dans la région Rhône et Hte-Savoie et même la moyenne vallée du Rhône. A leurs débuts, ces dégâts ont pu être enrayerés à l'aide de Plictran, Neoron ou de divers produits à base d'Endosulfan, mais il est possible que la gamme des produits efficaces soit plus étendue.

GRANDES CULTURES

MILDIOU de la POMME de TERRE - La protection devra être entreprise dans les parcelles d'altitude où le stade vulnérable est atteint.

MILDIOU de la TOMATE - Le risque de propagation n'existe encore actuellement en culture industrielle que dans les parcelles soumises à l'aspersion.

L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
RHONE - ALPES,

R. GIREAU

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes . Le Directeur gérant : P. JOURNET.
Inscription à la C.P.P.A.P. N° 477 AD.

P 350